



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ
HASCO-LEK S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Tekst ulotki informacyjnej

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

FEROVIT Bio Special BABY

zawiesina

ZAWIERA LIPOFER®
MIKROKAPSUŁKOWANE
LIPOSOMOWE ŻELAZO

- BRAK METALICZNEGO POSMAKU
- DELIKATNE DLA PRZEWODU POKARMOWEGO
- WYSOKA BIODOSTĘPNOŚĆ

od pierwszych dni życia

Składniki: olej roślinny MCT (średniołańcuchowe trójglicerydy), Lipofer® (skrobia kukurydziana, difosforan żelaza, emulgator - lecytyna słonecznikowa), naturalny aromat bananowy.

Wartość odżywcza	100 ml	1 ml
Wartość energetyczna	3379 kJ/822 kcal	34 kJ/8 kcal
Tłuszcz	88 g	0,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone	88 g	0,9 g
Węglowodany	8,3 g	0,1 g
- w tym cukry	0 g	0 g
Białko	0 g	0 g
Sól	< 0,01 g	< 0,01 g
Żelazo	1000 mg	10 mg

0,1 ml zawiera 1 mg żelaza

1 ml zawiera 10 mg żelaza

FEROVIT Bio Special BABY przeznaczony jest do postępowania dietetycznego w celu zapobiegania niedoborom żelaza i niedokrwistości z niedoboru żelaza (anemii).

Przeznaczony jest dla:

- noworodków i niemowląt: szczególnie z małą masą urodzeniową, urodzonych przedwcześnie, z ciąż mnogich oraz urodzonych przez matki z niedokrwistością w czasie ciąży
- dzieci.

Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza.

Dawkowanie i długość stosowania produktu zależą od stopnia niedoboru żelaza.

Doustna strzykawka dozująca z podziałką, co 0,1 ml, pozwala na dokładne odmierzenie właściwej porcji produktu i dostosowanie odpowiedniej dawki żelaza do masy ciała.

FEROVIT Bio Special BABY zawiera difosforan żelaza (pirofosforan żelaza) w postaci mikrokapsułkowanego liposomowego żelaza LIPOFER®. Żelazo LIPOFER® poddano mikronizacji, czyli dużemu rozdrobnieniu cząsteczek, a następnie zamknięto w liposomach dzięki czemu wykazuje ono dużą biodostępność i jest delikatne dla przewodu pokarmowego. Żelazo LIPOFER® w postaci mikrokapsułkowanego liposomowego żelaza nie pozostawia także metalicznego posmaku.

Sposób użycia:

Dawkowanie i czas stosowania produktu zależą od stopnia niedoboru żelaza i powinny odbywać się według zaleceń lekarza.

Dawki żelaza zależne są także od masy ciała.

Zalecenia ekspertów dotyczące suplementacji żelazem:

Grupa ryzyka wczesnych niedoborów żelaza: wcześniaki, niemowlęta urodzone o czasie z niską masą urodzeniową, dzieci z ciąż mnogich i z matek z niedokrwistością w czasie ciąży:

- 1-2 mg żelaza/kilogram masy ciała/dobę.

Wewnątrz opakowania znajduje się strzykawka dozująca z podziałką, co 0,1 ml, pozwalająca na odmierzenie właściwej ilości produktu zawierającej odpowiednią dawkę żelaza.

W tabelce przedstawiono przykładowe ilości produktu i odpowiadające im dawki żelaza.


Ilość produktu (wskaźnik podziałki)	Zawartość żelaza
0,1 ml	1 mg
0,2 ml	2 mg
0,3 ml	3 mg
0,4 ml	4 mg
0,5 ml	5 mg
1 ml	10 mg
1,5 ml	15 mg
2 ml	20 mg
2,5 ml	25 mg
3 ml	30 mg

Przed każdym użyciem produkt należy energicznie i dokładnie wymieszać, w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Po zakończeniu mieszania należy odmierzyć właściwą dawkę produktu za pomocą strzykawki dozującej.

Instrukcja użycia strzykawki dozującej:

- należy odkręcić zakrętkę i nałożyć strzykawkę na korek umieszczony w szyjce butelki,
- aby napełnić strzykawkę, butelkę należy energicznie wstrząsnąć, odwrócić do góry dnem, a następnie ostrożnie przesunąć tłok strzykawki do dołu, wciągając zawiesinę w pożądaną ilość określoną na podziałce,
- strzykawka posiada podziałkę, co 0,1 ml,
- w celu dokładnego odmierzenia dawki kołnierz korpusu strzykawki powinien zostać ustawiony na linii podziałki znajdującej się na tłoku,
- butelkę odwrócić do pozycji początkowej i ostrożnie wyjąć strzykawkę z korka,



- końcówkę strzykawki należy umieścić w ustach dziecka, a następnie wolno wciskając tłok, ostrożnie opróżnić zawartość strzykawki,
- po zastosowaniu butelkę zamknąć, a strzykawkę umyć i wysuszyć.

Uwaga! Nie należy opróżniać zawartości strzykawki z powrotem do butelki.

Należy zachować odstęp czasowy pomiędzy przyjmowaniem preparatu i karmieniem dziecka mlekiem.

Bez dodatku barwników, substancji słodzących i substancji konserwujących.

Bezglutenowy.

Nie zawiera białek mleka krowiego i laktozy.

Ważna informacja:

Produkt do postępowania dietetycznego w celu zapobiegania niedoborom żelaza i niedokrwistości z niedoboru żelaza (anemii).

Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza.

Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Po otwarciu butelki produkt należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO – LEK S.A.

ul. Żmigrodzka 242 E

51-131 Wrocław

... ml